


Caderno de apoio para abordagem

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA PLANTIO EM VIAS PÚBLICAS.

(Constam aqui apenas as espécies com
mudas disponíveis na região na
época do piloto - out-dez/2006)





Aroeira-pimenteira

Schinus terebinthifolia

porte médio(5 a 10m), perenifólia, atrai pássaros, crescimento rápido, higrófito

flor: setembro a janeiro

fruto: janeiro a julho

Espécie Nativa, indicada para plantio onde não há fiação



Capororoca branca

Rapanea gardneriana

porte médio (4 a 8 m), decídua, atrai pássaros, crescimento lento, higrófito

flor: junho a julho

fruto: outubro a dezembro

Espécie Nativa



Sabão de soldado

Sapindus saponaria

porte médio (5 a 9m), semi-decídua, atrai pássaros, crescimento moderado, higrófito
flor: abril a junho

fruto: setembro a outubro

Espécie Nativa, indicada para plantio onde não há fiação.



Calistemon ou escova de garrafa

Callistemon viminalis

Porte pequeno (5 a 7 m), perenifolia, não atrai pássaros, crescimento rápido, higrófito

Flor: junho a setembro

Frutos: novembro a junho.

Espécie Exótica (Austrália) indicada para plantio em sob-fiação.



Resedá (branco ou rosa)

Lagerstroemia indica, *Lagerstroemia paniculata*

porte pequeno (4 a 6m), decídua, não atrai pássaros.

flor: no verão, à pleno sol.

Espécie exótica (Austrália e Ásia), indicada para plantio sob fiação.



Quaresmeira

Tibouchina granulosa

porte médio (8 a 12 m), semi-decídua, crescimento demorado, não atrai pássaros, higrófito.

flor: julho a agosto e dezembro a março (duas vezes no ano).

Espécie Nativa, indicada para plantio onde não há fiação.



Alfeneiro


Ligustrum lucidum

porte médio (4 a 8 m), perenifólia, higrófita, crescimento rápido, atrai pássaros

flor: outubro a dezembro

fruto: maio a julho

Espécie exótica (China)



Jacarandá de Minas

Jacarandá Cuspidifolia

porte médio (5 a 10m), decídua, não atrai pássaros, crescimento moderado, xerófita

flor: setembro a outubro

fruto: agosto a setembro

Espécie Nativa, indicada para plantio em locais onde não há fiação.



Ipê Amarelo

Tabebuia Chysotricha

porte médio (4 a 10m), decídua, não atrai pássaros, crescimento moderado, higrófito

flor: agosto a setembro

frutos: setembro a outubro

Espécie Nativa, indicada para plantio em locais onde não há fiação.



Oiti

Licania tomentosa

porte médio a grande (8 a 15m), perenifólia, atrai pássaros, crescimento rápido, higrófito

flor: julho a agosto

fruto: janeiro a março

Espécie nativa

Indicada para locais onde não há fiação, e em alguns casos, onde há fiação.



Ipê Branco

Tabebuia roseo-alba

porte grande (7 a 16m), decídua, crescimento rápido, xerófita

flor: julho a setembro

fruto: outubro

Espécie Nativa



Ipê Branco do Cerrado

Tabebuia dura

porte médio (4 a 7 metros), decídua, crescimento rápido, higrófito

flor: julho a setembro e fevereiro a abril

fruto: setembro a novembro e março a maio

Espécie Nativa



Manacá-da-serra anão

Tibouchina mutabilis "nana"

porte pequeno (2 a 4 metros), crescimento demorado, higrófito, atrai borboletas
flor: mutável, branca e depois roxo-claro e roxo-escuro.

Espécie Nativa



Ipê Amarelo
(*Tabebuia chrysotricha*)

Realização  Parceira  Apoio 

Em cada árvore há um selo adesivo para identificação colado no tutor.

Abertura na calçada com dimensões mínimas de 50x50cm e mureta de 10cm abaixo do nível da calçada para orientar as raízes para baixo.



Imagens: Harri Lorenzi - Instituto Plantarum, Marta Kawamura- Ong Ramudá, Leandro Moraes Furlan
[Http://www.arbolesornamentales.com](http://www.arbolesornamentales.com)
<http://davesgarden.com>, <http://toptropicals.com>
<http://www.acap-peru.org>
<http://bananaetc.blogbrasil.com>